

ABSTRAK

Masalah penyalahgunaan NAPZA di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya faktor keluarga, pengaruh teman sebaya, lingkungan masyarakat dan ketersediaan NAPZA. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan NAPZA. Penelitian menggunakan desain deskriptif analitik dengan pendekatan *cross sectional study*. Objek yang diteliti seluruh pasien yang berkunjung ke Instalasi NAPZA RSJ Padang pada bulan April-Mei, pengambilan sampel dengan *Accidental Sampling* dengan jumlah sampel yaitu 32 orang. Instrument yang digunakan berupa kuesioner. Data diolah secara univariat dan bivariat dengan menggunakan uji chi-square dengan batas kemaknaan $p < 0,05$. Hasil analisis univariat didapatkan faktor keluarga kategori kondusif (53,1%), faktor teman sebaya kategori buruk (56,3%), faktor lingkungan masyarakat kategori buruk (59,4%), faktor keberadaan NAPZA kategori mendukung NAPZA (53,1%). Dari analisis bivariat didapatkan tidak adanya hubungan faktor keluarga dengan penyalahgunaan NAPZA, dan adanya hubungan faktor teman sebaya, lingkungan masyarakat, keberadaan NAPZA dengan penyalahgunaan NAPZA ($p < 0,05$). Mengatasi penyalahgunaan NAPZA dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, baik orang tua yang akan memberikan pola asuh dan bimbingan dan dari pihak masyarakat, tenaga kesehatan.

Kata kunci : Penyalahgunaan Napza, Teman Sebaya, Lingkungan Masyarakat

ABSTRACT

Drug abuse problem in Indonesia is increasing from year to year. This is a threat to the welfare of future generations. The factors that influence factors such as family, peer, community and drug availability. Research purposes to determine the factors that influence drug abuse. This research uses descriptive analytical approach to the design of cross-sectional study. Objects studied all patients who visit the Installation drug in April-May, with Accidental Sampling with a sample that is 32 people. Instruments used in the form of questionnaires. Data processed using SPSS computerized system and analyzed using univariate and bivariate chi-square test with significance limit of $p < 0.05$. The results of univariate analysis on the gain factor family (53.1%), peer factors (56.3%), the environmental factors (59.4%), the factors being drug (53.1%). From the bivariate analysis found no relationship of family factors with drug abuse, and the gain factor of peer relationships, community environment, the presence of drug to drug abuse (< 0.05). In the fight against drug abuse required cooperation from various parties, ranging from parents who will provide guidance and parenting, the public, health professionals as a counselor, preventive, rehabilitative, government implementation Drug Law and Regulation.

Key words: Drug, Drug Abuse, Peer group, Society of Environmental